

TOFACITINIB

¿Para que sirve?:

Pertenece a una clase de medicamentos llamados JAK (Januskinase), éstas son enzimas involucradas en estimular la creación de células sanguíneas y la función de las células inmunes. Tofacitinib es un inhibidor potente de la familia de las JAK, lo que disminuye la acción de diversas interleucinas proinflamatorias y también de los interferones, modulando así la respuesta inmune e inflamatoria.

Se utiliza para el tratamiento de las siguientes enfermedades inflamatorias:

- Artritis reumatoide
- Artritis psoriásica
- Colitis ulcerosa



¿Cómo usarlo adecuadamente?

El Tofacitinib viene en comprimido para administración oral, se debe tomar una tableta cada 12 horas. la dosis se puede ajustar durante los tres primeros días. Se puede tomar en cualquier momento tanto antes, como durante, después o entre las comidas, pero una vez elegida la hora de la toma, siempre se debe seguir el mismo horario. Hay que tomar el comprimido entero con suficiente líquido, idealmente con agua.

Almacenamiento

No dejar al alcance de niños o mascotas, evite áreas muy húmedas como el baño o cerca a fuentes de calor como la cocina, evite exposición directa a los rayos del sol por lo cual no se debe dejar cerca de ventanas.

Procure romper las cajas del medicamento cuando termine su contenido. En caso de que no se consuma todas las cápsulas, diríjase a un punto azul para su desecho

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si se acerca la hora de su próxima dosis, omita la dosis que no tomó, y siga con su horario normal de medicación. No duplique la dosis para compensar la que omitió..

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Predisposición a infecciones: pulmonares (neumonía y bronquitis), herpes zóster, infecciones en las fosas nasales, garganta o tráquea (nasofaringitis), gripe, sinusitis, infección de la vejiga urinaria (cistitis), dolor de garganta (faringitis)
- Aumento de enzimas musculares en sangre (signos de problemas en músculos)
- Dolor de estómago, vómito, diarrea, indigestión
- Fatiga (cansancio), hinchazón de pies y manos, dolor de cabeza, erupción cutánea

Informe a su médico líder o reumatólogo si...

- Si evidencia que su enfermedad está empeorando (p. ej. Debilidad, dolores fuertes) o si advierte cualquier síntoma nuevo.
- Sospecha de embarazo o planea procrear durante el tratamiento.
- Infecciones, disnea nueva o que empeoran las condiciones de salud
- Signos y síntomas de lesión hepática, dolor abdominal que se irradia a zona derecha.
- Algún evento adverso durante el tratamiento.

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..