



¿Para que sirve?:

Se utiliza para tratar a pacientes adultos, así como a adolescentes y niños a partir de los 7 años de edad, con diagnóstico confirmado de la enfermedad de Fabry. Se emplea como terapia a largo plazo de sustitución enzimática cuando el nivel de enzimas α -galactosidasa en el organismo está ausente o es más bajo de lo normal

¿Cómo usarlo adecuadamente?

Este medicamento debe utilizarse exclusivamente bajo la debida supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de la enfermedad de Fabry. Debe ser administrado por un médico o profesional de enfermería mediante perfusión intravenosa en un tiempo no menor a 40 minutos. Se aplica cada dos semanas.

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si falta a una cita para recibir el medicamento, llame a su médico de inmediato

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan está relacionado con Reacciones alérgicas, que aparecen durante la perfusión o poco tiempo después. Entre los síntomas reportados están

- Dolor de cabeza
- Mareo
- Fiebre
- Dolor de espalda
- Dolor en las articulaciones
- Aumento de presión arterial
- Visión borrosa
- Vómitos



Si se produjera cualquiera de estas reacciones, infórmelo de inmediato al personal de salud.

Otros efectos adversos se incluyen:

- Dolor o molestias generales
- Hormigueos, adormecimiento o dolor en los dedos de los pies o de las manos
- Cambios en el sabor de los alimentos
- Lagrimeo ocular
- Zumbido en los oídos
- Prolongación del sueño
- Palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial
- Tos, dolor u opresión torácicos, ronquera, dolor u opresión en la garganta, secreciones pegajosas en la garganta, secreciones nasales, síntomas de resfriado
- Acné, enrojecimiento, picor o manchas en la piel

Informe a su médico líder o especialista...

- Es ha presentado alergia al medicamento.
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa el medicamento

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido.

Fuentes de información

[Centro de información online de medicamentos de la AEMPS - CIMA](#)