

FACTOR VII ACTIVADO



¿Para que sirve?:

Es un factor de coagulación de la sangre. Actúa activando el sistema coagulador de la sangre en el lugar de la hemorragia cuando los factores de coagulación propios del paciente no funcionan.


Se utiliza para el tratamiento de hemorragias y la prevención de hemorragias excesivas después de intervenciones quirúrgicas u otros tratamientos importantes. El tratamiento temprano con NovoSeven reduce la cantidad y el tiempo de hemorragia. Funciona en todos los tipos de hemorragias, incluyendo hemorragias articulares. Esto reduce la necesidad de hospitalización y los días de ausencia en el trabajo o en el colegio.

¿Cómo usarlo adecuadamente?

- No utilice el equipo sin la formación adecuada por parte de su médico o enfermero.
- Lávese siempre las manos y asegúrese de que la zona a su alrededor esté limpia.
- Cuando prepara e inyecta un medicamento directamente en una vena es importante utilizar una técnica limpia y libre de gérmenes (aséptica). Una técnica inapropiada puede introducir gérmenes capaces de infectar la sangre.
- No abra el equipo hasta que esté listo para utilizarlo.
- No utilice el equipo si se le ha caído o si está dañado. En ese caso utilice un nuevo envase.
- No utilice el equipo si ha caducado. En ese caso utilice un nuevo envase.
- No utilice el equipo si sospecha que está contaminado. En ese caso utilice un nuevo envase.
- No deseche ninguno de los materiales hasta que se haya inyectado la solución reconstituida.
- El equipo es para un solo uso.

Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.



Disposición final

Las agujas deben desecharse en un contenedor rígido o guardian y los viales en bolsa roja

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si olvidó ponerse una inyección del medicamento o quiere interrumpir el tratamiento, consulte al médico inmediatamente.

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, entre estas están:

- Acontecimientos tromboembólicos arteriales (oclusión arterial cerebral, accidente cerebrovascular).
- Acontecimientos tromboembólicos venosos (embolia pulmonar y trombosis venosa profunda).
- Angina de pecho
- Náuseas, fiebre, y sarpullido eritematoso

Informe a su médico líder o especialista...

- Si acaba de someterse a una intervención quirúrgica
- Si acaba de sufrir un traumatismo por aplastamiento
- Si sus arterias son más estrechas debido a una enfermedad (ateroesclerosis)
- Si tiene un mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos (trombosis)
- Si padece una enfermedad hepática grave
- Mencione qué medicamentos está usando para descartar interacciones
- Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada.

Consulte inmediatamente si

- Administra una dosis superior a la formulada

¿Qué hacer en caso de emergencia?



Si no se controla la hemorragia dentro de las primeras 24 horas

- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido.

Fuentes de información

- Centro de información online de medicamentos de la AEMPS - CIMA