

VELAGLUCERASA ALFA

¿Para que sirve?:

Es una terapia de sustitución enzimática (TSE) a largo plazo para pacientes con enfermedad de Gaucher de tipo 1



La enfermedad de Gaucher es un trastorno genético provocado por la falta de una enzima o la presencia de una enzima defectuosa, llamada glucocerebrosidasa. Cuando esta enzima está ausente o no actúa correctamente, se acumula una sustancia llamada glucocerebrósido en las células del organismo. La acumulación de este material provoca los signos y síntomas que se presentan en la enfermedad de Gaucher.

¿Cómo usarlo adecuadamente?

Este medicamento debe utilizarse exclusivamente bajo la debida supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. Debe ser administrado por un médico o profesional de enfermería mediante perfusión intravenosa. Se aplica cada dos semanas en un tiempo no menor a 60 minutos

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si falta a una cita para recibir un producto de inyección de velaglucerasa alfa, llame a su médico de inmediato

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan está relacionado con Reacciones alérgicas, que aparecen durante la perfusión o poco tiempo después. Entre los síntomas reportados están

- Dolor de cabeza
- Mareo
- Fiebre
- Dolor de espalda
- Dolor en las articulaciones
- Aumento de presión arterial
- Visión borrosa
- Vómitos



Si se produjera cualquiera de estas reacciones, infórmelo de inmediato al personal de salud.

Otros efectos adversos se incluyen:

- Dolor de estómago
- Prolongación del tiempo que tarda una herida en dejar de sangrar que puede ocasionar un fácil sangrado, hemorragias espontáneas y formación de hematomas
- Enrojecimiento de la piel
- Aceleración de los latidos del corazón

Informe a su médico líder o especialista...

- Es ha presentado alergia al medicamento, ya que es posible que requiera tratamiento previo con antihistamínicos, antipiréticos y corticoesteroides, para prevenir la aparición de estos síntomas.
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa el medicamento

¿Qué hacer en caso de emergencia?

- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido.



Fuentes de información

[Centro de información online de medicamentos de la AEMPS - CIMA](#)