

FINGOLIMOD

¿Para que sirve?:

Fingolimod está indicado como tratamiento alternativo de pacientes adultos con esclerosis múltiple recidivante remitente

¿Cómo usarlo adecuadamente?

El fingolimod viene en cápsulas para tomar por vía oral. Se toma una vez al día, aproximadamente a la misma hora, con o sin alimentos.



No se recomienda triturar o masticar la cápsula y use siempre agua para facilitar su digestión.

Almacenamiento

No dejar al alcance de niños o mascotas, evite áreas muy húmedas como el baño o cerca a fuentes de calor como la cocina, evite exposición directa a los rayos del sol por lo cual no se debe dejar cerca de ventanas.

Procure romper las cajas del medicamento cuando termine su contenido. En caso de que no se consuma todas las cápsulas, diríjase a un punto azul para su desecho

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Tome la dosis que omitió tan pronto como la recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y llame a su médico antes de tomar la siguiente dosis. Puede ser necesario supervisarle conforme vuelva a comenzar a tomar el medicamento. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida.

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Dolor de cabeza,
- Enrojecimiento, picazón, hinchazón, descoloración, o irritación en el sitio de la inyección,
- Dolor de articulaciones,
- Diarrea.
- Fiebre

Informe a su médico líder o especialista si...

- Evidencia que su EM está empeorando (p. ej. debilidad o cambios visuales) o si advierte cualquier síntoma nuevo.
- Sospecha de embarazo o planea quedar embarazada durante el tratamiento.
- Infecciones, disnea nueva o que empeoran las condiciones de salud.
- Signos y síntomas de lesión hepática.

¿Cuándo No Debo Tomar O Debo Suspender El Medicamento?

- Si es alérgico al fingolimod o a alguno de los demás componentes de este medicamento.
- Si en los últimos 6 meses, ha tenido un ataque de corazón, angina de pecho, accidente cerebrovascular o aviso de accidente cerebrovascular o algún tipo de insuficiencia cardíaca.
- Si está embarazada o si es una mujer en edad fértil y no utiliza un método anticonceptivo efectivo.
- Si está tomando o ha tomado recientemente medicamentos para el latido cardíaco (del corazón) irregular.

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido.