

¿Para que sirve?:


El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado. Actúa uniéndose específicamente a receptores de interleuquina 6 (IL-6), que es una proteína con actividad inflamatoria, por lo cual se prescribe para el manejo de enfermedades autoinmunes como:

- Artritis reumatoide (AR) moderada a grave.
- Artritis juvenil idiopática poliarticular (AJI), moderada a grave.
- Artritis psoriásica activa (aps).



¿Cómo usarlo adecuadamente?

- Este medicamento puede encontrarse en presentación para infusión la cual se administra por vía intravenosa. La frecuencia de aplicación será definida por el médico. Esta administración puede tardar 1 (una) hora.
- También puede encontrarse en jeringa prellena para administración subcutánea (debajo de la piel), La frecuencia es la misma que cuando se usa la presentación Intravenosa.




Puede administrarlo por vía subcutánea en cualquier lugar de la parte delantera de los muslos (parte superior de la pierna), parte trasera de la parte superior de los brazos o en el abdomen (estómago), excepto en ombligo y en el área de 2 pulgadas (5 centímetros) a su alrededor. Para reducir las posibilidades de dolor o enrojecimiento, utilice un lugar diferente para cada inyección. No la inyecte en un área donde la piel esté sensible, con moretones, roja, o dura

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Retire la jeringa del refrigerador, colóquela en una superficie plana sin retirar la tapa de la aguja o dispositivo, y deje que se caliente a temperatura ambiente durante aproximadamente a 15 minutos antes de inyectar el medicamento.
- No intente calentar el medicamento en un horno de microondas, colocándolo en agua caliente, dejándolo bajo la luz solar o por cualquier otro método.
- Lávese las manos antes de aplicar el medicamento.
- No retire el tapón de la jeringa prellenada mientras deja que el medicamento llegue a temperatura ambiente. Debe quitar la tapa no más de 5 minutos antes de inyectarse el medicamento. No vuelva a colocar el tapón después de retirarlo.
- No use la jeringa si se le cae al suelo.

Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.



Disposición final



No deseche las jeringas directamente a la basura, almacene en un recipiente resistente como una botella de detergente limpia y opaca.

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Llame a su EPS si no acude a una cita para recibir una infusión de tocilizumab y re programe la cita

Si olvida de inyectar una dosis subcutánea de tocilizumab, inyecte la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si se acerca la hora de su próxima dosis, omita la dosis que no tomó, y siga con su horario normal de medicación. No inyecte una dosis doble para compensar la que omitió

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Dolor de cabeza
- Secreción nasal o estornudos
- Enrojecimiento, picazón, dolor o hinchazón en el lugar de la inyección de tocilizumab



Informe a su médico líder o reumatólogo si...

- Es alérgico al tocilizumab.
- Si tiene o ha tenido cáncer; diverticulitis (pequeñas bolsas en el revestimiento del intestino grueso que pueden inflamarse); úlceras en el estómago o los intestinos; colesterol y triglicéridos altos; cualquier enfermedad que afecte el sistema nervioso, como esclerosis múltiple (EM; una enfermedad en la que los nervios no funcionan correctamente y las personas pueden experimentar debilidad, entumecimiento, pérdida de coordinación muscular y problemas de visión, habla y control de la vejiga) o polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC; un trastorno de los sistemas inmunológico y nervioso) o una enfermedad hepática..
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa el medicamento
- Si se someterá a una cirugía, incluida una cirugía dental.
- Informe a su médico si ha recibido recientemente alguna vacuna o tiene programado recibir una. No se vacune mientras esté usando tocilizumab o durante 3 meses después de su dosis final de tocilizumab sin consultar a su médico.
- Si evidencia que su enfermedad está empeorando (p. ej. Debilidad, dolores fuertes) o si advierte cualquier síntoma nuevo.

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..