

ACIDO TRANEXAMICO

¿Para que sirve?:

El ácido tranexámico pertenece a una clase de medicamentos denominados antifibrinolíticos, inhibe la activación del plasminógeno a plasmina. propicia la estabilidad de los coágulos y sirve como terapia auxiliar en la hemofilia.



¿Cómo usarlo adecuadamente?

El ácido tranexámico puede encontrarse en tabletas y en solución inyectable.

La solución inyectable se administra en centros de salud y será administrado por personal entrenado conforme a indicaciones médicas.

Las tabletas se toma con o sin alimentos tres o cuatro veces al día, según indicación médica. Debe tomarse aproximadamente a la misma hora todos los días que deba recibir una dosis.

En algunos casos se puede usar como enjuague bucal, con el fin de controlar las hemorragias orales para ello siga las siguientes indicaciones:

1. Triturar las tabletas (siga las indicaciones del médico) y diluir en 10 ml de agua.
2. Mantener la solución en la boca durante el mayor tiempo posible (aproximadamente 5 minutos).
3. Tragar la solución.

Para niños muy pequeños, la tableta puede transformarse en una pasta y aplicarse directamente en el lugar de la hemorragia.

Almacenamiento

No dejar al alcance de niños o mascotas, evite áreas muy húmedas como el baño o cerca a fuentes de calor como la cocina, evite exposición directa a los rayos del sol por lo cual no se debe dejar cerca de ventanas.

Procure romper las cajas del medicamento cuando termine su contenido. En caso de que no se consuma todas las tabletas, diríjase a un punto azul para su desecho

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde, pero luego tome su próxima dosis, al menos, 6 horas más tarde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, deje pasar la dosis que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome más de dos tabletas a la vez para compensar la que olvidó.

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Dolor de cabeza.
- Cansancio.
- Dolor en los senos paranasales.
- Dolor de espalda.
- Dolor óseo, articular o muscular.
- Dolor de estómago.



Signos de alarma

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si presenta alguno de estos síntomas, deje de tomar ácido tranexámico y llame a su médico de inmediato o dirijase a urgencias:

- Urticaria.
- Sarpullido.
- Comezón.
- Dificultad para respirar o tragar.
- Inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o las pantorrillas.
- Ronquera.
- Cambios en la visión, incluida la visión del color.
- Dolor en el pecho.
- Falta de aire.
- Dolor, inflamación, sensibilidad, enrojecimiento o calor en las piernas

Informe a su médico líder o especialista si...

- Si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad renal.
- Sospecha de embarazo o planea quedar embarazada durante el tratamiento.
- Si se va a realizar una cirugía, incluso una cirugía dental

¿Qué hacer en caso de sobredosis?

Dirijase a urgencias e indique la dosis consumida

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

- Náuseas.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Mareos.
- Cambios en la visión.
- Cambios en la conducta o en el estado de ánimo.
- Temblor o sacudones incontrolables de una parte del cuerpo.
- Sarpullido.

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..

Fuentes de información

- [Centro de información online de medicamentos de la AEMPS - CIMA](#)
- Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NLM) - medlineplus.gov