

## ¿Para que sirve?:

El infliximab es un medicamento biológico que logra controlar estas patologías al disminuir la actividad del sistema inmune bloqueando específicamente un grupo de defensas del cuerpo llamadas  $\alpha$ -TNF.

Se usa para el tratamiento de:

- Artritis reumatoide
- Espondilitis anquilosante
- Artritis psoriásica
- Psoriasis
- Enfermedad de Crohn
- Colitis ulcerosa



## ¿Cómo usarlo adecuadamente?

Este medicamento puede encontrarse en presentación para infusión la cual se administra por vía intravenosa. La aplicación se realizará cada 2 a 8 semanas, de acuerdo como lo indique el médico, siempre el mismo día de la semana. Esta administración puede tardar unos 30 minutos.

## Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si falta a una cita para recibir un producto de inyección de infliximab, llame a su médico de inmediato.

## Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Náusea
- Acidez estomacal
- Dolor de cabeza
- Secreción nasal
- Parches blancos en la boca
- Rubor
- Picazón, ardor y dolor vaginal, u otros síntomas de una infección vaginal



## Informe a su médico líder o reumatólogo si...

- Es alérgico al etanercept.
- Si tiene o ha tenido convulsiones; una enfermedad que afecte el sistema nervioso, como la esclerosis múltiple (EM; pérdida de coordinación, debilidad y entumecimiento debido a daños en los nervios), mielitis transversa (inflamación de la médula espinal que puede causar sensaciones anormales, pérdida de sensibilidad o pérdida de la capacidad de mover la parte inferior del cuerpo), síndrome de Guillain-Barré (debilidad, hormigueo y posible parálisis debido a daños repentinos en los nervios) o neuritis óptica (inflamación del nervio que envía mensajes del ojo al cerebro); problemas de hemorragia; enfermedad del hígado o insuficiencia cardíaca.
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa el medicamento
- Si se someterá a una cirugía, incluida una cirugía dental.
- Informe a su médico si recientemente le administraron una vacuna. También consulte con su médico para saber si tiene que recibir alguna vacuna. No se vacune sin antes hablar con su médico.
- Debe saber que es posible que tenga una reacción alérgica retrasada 3 a 12 días después de recibir algún producto de la inyección de infliximab. Informe a su médico si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas varios días o más después de su tratamiento: dolor muscular o de articulaciones; fiebre; sarpullido; urticaria; picazón; inflamación de las manos, el rostro o los labios; dificultad para tragar; dolor de garganta y dolor de cabeza.

## ¿Qué hacer en caso de emergencia?

- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..

