

USTEKINUMAB

¿Para que sirve?:

El Ustekinumab detiene la acción de ciertas células en el cuerpo que causan síntomas de psoriasis y artritis psoriásica.


Por tal motivo está indicado en el tratamiento de:

- Artritis psoriásica que no ha respondido a tratamientos previos.
- Psoriasis en placas moderada-grave que no ha respondido a otros tratamientos



¿Cómo usarlo adecuadamente?

El Ustekinumab viene en un dispositivo de inyección automática para ser aplicado vía subcutánea (debajo de la piel) una vez cada 4 semanas (las primeras dos dosis) y luego cada 8 semanas



Puede administrarlo en cualquier lugar de la parte delantera de los muslos (parte superior de la pierna), parte trasera de la parte superior de los brazos o en el abdomen (estómago), excepto en ombligo y en el área de 2 pulgadas (5 centímetros) a su alrededor. Para reducir las posibilidades de dolor o enrojecimiento, utilice un lugar diferente para cada inyección. No la inyecte en un área donde la piel esté sensible, con moretones, roja, o dura.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Retire la jeringa del refrigerador, colóquela en una superficie plana sin retirar la tapa de la aguja o dispositivo, y deje que se caliente a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 minutos antes de inyectar el medicamento.
- No intente calentar el medicamento en un horno de microondas, colocándolo en agua caliente, dejándolo bajo la luz solar o por cualquier otro método.
- Lávese las manos antes de aplicar la inyección de guselkumab y cuidado de no exceder los 5 minutos de retirar la tapa de la aguja. No reemplace la tapa de la aguja o el dispositivo porque esto puede dañar la aguja o causar lesiones. No use un dispositivo de inyección automática si se ha caído después de quitar la tapa.

Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.



Disposición final

No deseche las jeringas directamente a la basura, almacene en un recipiente resistente como una botella de detergente limpia y opaca.

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Administre la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde y luego siga tomando su dosis normal. No duplique la dosis para compensar la que omitió.

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Dolor de cabeza
- Secreción o congestión nasal, o estornudos
- Cansancio
- Enrojecimiento o irritación en el sitio de la inyección
- Náusea
- Vómitos
- Dolor de las articulaciones



Importante: Informe a su médico o farmacéutico algún síntoma extraño que presente e incluso si se trata de síntomas que no se mencionaron anteriormente.

Signos de alarma

Busque asistencia médica si nota alguno de los siguientes adversos:

- Posibles Infecciones graves: los signos pueden incluir: Fiebre mayor a 3 días, síntomas gripales mayores a 3 días, sudoración nocturna, sensación de cansancio, dificultad para respirar o tos persistente; piel caliente, enrojecida y dolorosa al roce; erupción (brote) en la piel dolorosa con ampollas o secreción amarillenta; ardor al orinar permanente.
- Reacción alérgica grave: Los signos pueden incluir dificultad para respirar o para tragar, tensión arterial baja (puede causar mareo o aturdimiento), hinchazón del rostro, labios o garganta; rasquiña intensa acompañada de brote o ampollas

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..