

¿Para que sirve?:


El abatacept un medicamento del grupo de moduladores selectivos de la coestimulación (inmunomoduladores). Su acción consiste en bloquear la actividad de las células T, un tipo de célula inmunitaria del cuerpo que causa inflamación y daño en las articulaciones en personas que padecen alguna de estas enfermedades:

- Artritis reumatoide (AR) moderada a grave.
- Artritis juvenil idiopática poliarticular (AJI), moderada a grave.
- Artritis psoriásica activa (APs).



¿Cómo usarlo adecuadamente?

- Este medicamento puede encontrarse en presentación para infusión la cual se administra por vía intravenosa. Debe realizarse la administración cada 15 días durante las primeras 3 dosis y luego mensualmente el mismo día del mes y será supervisado por un profesional de IPS Especializada. Esta administración puede tardar unos 30 minutos.
- También puede encontrarse en jeringa prellena para administración subcutánea (debajo de la piel), La frecuencia es la misma que cuando se usa la presentación Intravenosa.




Puede administrarlo por vía subcutánea en cualquier lugar de la parte delantera de los muslos (parte superior de la pierna), parte trasera de la parte superior de los brazos o en el abdomen (estómago), excepto en ombligo y en el área de 2 pulgadas (5 centímetros) a su alrededor. Para reducir las posibilidades de dolor o enrojecimiento, utilice un lugar diferente para cada inyección. No la inyecte en un área donde la piel esté sensible, con moretones, roja, o dura

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Retire la jeringa del refrigerador, colóquela en una superficie plana sin retirar la tapa de la aguja o dispositivo, y deje que se caliente a temperatura ambiente durante aproximadamente a 15 minutos antes de inyectar el medicamento.
- No intente calentar el medicamento en un horno de microondas, colocándolo en agua caliente, dejándolo bajo la luz solar o por cualquier otro método.
- Lávese las manos antes de aplicar el medicamento.
- No retire el tapón de la jeringa prellenada mientras deja que el medicamento llegue a temperatura ambiente. Debe quitar la tapa no más de 5 minutos antes de inyectarse el medicamento. No vuelva a colocar el tapón después de retirarlo.
- No use la jeringa si se le cae al suelo.

Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.



Disposición final



No deseche las jeringas directamente a la basura, almacene en un recipiente resistente como una botella de detergente limpia y opaca.

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si está recibiendo abatacept por vía intravenosa y no acude a una cita para recibir una infusión de abatacept, llame a su médico tan pronto como le sea posible y siga las indicaciones de reagendamiento

Si está recibiendo abatacept por vía subcutánea y omite una dosis, pídale a su médico un nuevo programa de dosificación.

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Dolor de cabeza
- Secreción nasal
- Náusea
- Diarrea
- Dolor de estómago
- Mareos
- Acidez estomacal
- Dolor de espalda
- Dolor en la brazos o piernas
- Hematomas, enrojecimiento y picazón en el lugar de la inyección
- Sangrado de nariz



Informe a su médico líder o reumatólogo si...

- Es alérgico al abatacept, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen los productos de la inyección de abatacept.
- Tiene una infección en cualquier parte del cuerpo, incluidas infecciones intermitentes, como herpes labial, e infecciones crónicas que no desaparecen, o si a menudo contrae algún tipo de infección, como infecciones de la vejiga. También informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC; un grupo de enfermedades pulmonares que incluye bronquitis crónica y enfisema); cualquier enfermedad que afecte su sistema nervioso, como la esclerosis múltiple; hepatitis B (un virus que afecta el hígado); diabetes; presión arterial alta o cualquier enfermedad que afecte su sistema inmunitario, como cáncer, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). También informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido tuberculosis o si ha estado cerca de alguien que tiene o ha tenido tuberculosis.
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa abatacept.
- Si se someterá a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que usa abatacept.
- Informe a su médico si ha recibido recientemente alguna vacuna o tiene programado recibir una. No se vacune mientras esté usando abatacept o durante 3 meses después de su dosis final de abatacept sin consultar a su médico.

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..