

FACTOR VIII



¿Para que sirve?:

El factor VIII está involucrado en la coagulación de la sangre. La falta de factor VIII significa que la sangre no coagula con la rapidez que debería hacerlo, con lo que se produce un incremento de la tendencia al sangrado.


Existen varios productos en el mercado que buscan aportar aporta factor VIII y así normalizar, temporalmente, los mecanismos de la coagulación.

¿Cómo usarlo adecuadamente?

La dosis de factor VIII que usted necesita y la duración del tratamiento dependen de varios factores, tales como su peso corporal, la gravedad de su enfermedad, la localización e importancia de la hemorragia o la necesidad de prevenir la hemorragia durante una operación o una revisión médica. Si le han indicado que debe usar el medicamento en casa, su médico se asegurará de que usted reciba las instrucciones debidas de como se inyecta el producto y cuanto producto debe usar. Siga las instrucciones que le ha dado su médico o las indicaciones de las enfermeras de su centro de hemofilia.

Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar. Es posible almacenarlo fuera de la nevera, por un tiempo máximo de seis meses, siempre y cuando la temperatura ambiente no supere los 25°.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.



Disposición final

Las agujas deben desecharse en un contenedor rígido o guardian y los viales en bolsa roja

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si olvidó ponerse una inyección del medicamento o quiere interrumpir el tratamiento, consulte al médico inmediatamente.

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, entre estas están:

- Reacciones alérgicas: picazón o urticaria, hinchazón de la cara o las manos, hinchazón u hormigüeo dentro de la boca o en la garganta, presión en el pecho, dificultad para respirar
- Visión borrosa
- Orina de color oscuro
- Tonalidad amarilla de la piel o del blanco de los ojos
- Dolores de cabeza
- Pérdida del apetito
- Náuseas, vómitos o dolor de estómago
- Nerviosismo
- Dolor, picazón, ardor, hinchazón o tumores por debajo de la piel en el lugar donde se coloca la aguja
- Cansancio

Informe a su médico líder o especialista...

- En caso de que aparezcan reacciones alérgicas o anafilácticas (reacciones alérgicas graves que producen graves dificultades respiratorias o mareos). Es posible que se produzcan reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgico. Su médico debe informarle de los primeros síntomas de las reacciones de hipersensibilidad. Entre ellos se incluye ronchas, sarpullido generalizado, presión en el pecho, dificultad en la respiración, caída de la presión sanguínea y anafilaxis (reacciones alérgicas graves que producen graves dificultades respiratorias o mareos). Si se producen esos síntomas, deje de usar el producto de inmediato y póngase en contacto con su médico.
- Si padece una enfermedad cardíaca o tiene riesgo de padecerla, informe a su médico o farmacéutico.

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido.

Fuentes de información

- [Centro de información online de medicamentos de la AEMPS - CIMA](#)